

Borkenflechte/Grindflechte (Impetigo contagiosa)

Erreger

- Streptokokken (kleinblasige Form) oder Staphylokokken (großblasige Form), häufig Mischinfektion beider Erreger

Betroffene Personen:

- Meist Kleinkinder, vereinzelt auch Erwachsene
- Risikofaktor: Hautbarrierestörung (Neurodermitis)

Übertragung

- Hochansteckend!
- Tröpfcheninfektion
- Schmierinfektion: Kontakt mit infektiösem Bläschen, gemeinsame Spielsachen

Inkubationszeit (Zeit zw. Ansteckung und Ausbruch der Erkrankung)

- 2-10 Tage

Symptome:

- Rötung der betroffenen Hautareale (meist Gesicht um den Mund herum, behaarte Kopfhaut und Hände), dann schnell aufplatzende Bläschen mit anschließend honiggelben Krusten
- Ggf. schmerzhafte Schwellung der regionären Lymphknoten

Behandlung:

- Antiseptische Lokalthherapie (Octenisept, Polyhexanid)
- Hygiene! (Fingernägel kürzen)
- Ggf. lokalantibiotische Therapie mit Fucidine
- Bei ausgeprägtem Befund ggf. systemische antibiotische Therapie

Verlauf/Prognose:

- Meist problemlose Ausheilung innerhalb weniger Tage

Achtung:

- Kein Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung bis zum Abheilen der Krusten