

Streptokokken-Infektion

Übertragung:

Tröpfcheninfektion

Erreger:

Streptokokken der Gruppe A

Inkubationszeit (Zeit zwischen Ansteckung und Ausbruch der Krankheit):

2 – 4 Tage

Symptome:

Rachenentzündung (Halsschmerzen), Fieber, Bauchschmerzen, Übelkeit, z.T. auch Kopf- und Gliederschmerzen.

Bei Scharlach zusätzlich: Himbeerzunge, blasses Munddreieck, Ausschlag (an den Leisten beginnend)

Therapie:

Penicillin konsequent 7 Tage lang in doppelter Dosierung

Dosierung:

Penicillin 500 Saft (z.B. Infectocillin):

- 10 – 20 kg: 3 x 1,0 Messlöffel = 5,0 ml
- 20 – 30 kg: 3 x 1,5 Messlöffel = 7,5 ml
- > 30 kg : 3 x 2,0 Messlöffel = 10,0 ml

Geschwisterprophylaxe:

Speichelkontakt meiden (Gläser, Besteck, Lutscher...)

Patient ist 24 Stunden nach 1. Gabe vom Penicillin nicht mehr ansteckend (d.h. Kindergarten- oder Schulbesuch wieder möglich).

ACHTUNG – Zahnbürstenwechsel nach 2 Tagen Antibiotikum